

معلومات هامة عن السلامة ل +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال -

من قصر النظر مع تصحيح يصل إلى ٦,٠ من (D) تم تصميم +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال لتصحيح أو تقليل ما يصل إلى -٢٠,٠ ديوبتر الاستجماتيزم للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ٢١ و ٦٠ عامًا. تعتبر زراعة +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال إجراءً جراحياً، وبالتالي تحمل مخاطر خطيرة محتملة. تشمل المضاعفات أو الأحداث السلبية المحتملة: عمليات جراحية إضافية، تكوين المياه البيضاء، فقدان مؤقت أو دائم لأفضل تصحيح للرؤية، ارتفاع ضغط العين الداخلي، فقدان الخلايا على السطح الداخلي للقرنية، تهيج الملتحمة، تورم القرنية، تهيج الملتحمة، التهاب باطن المقلة (عدوى كاملة بالعين)، وهج كبير و/أو هالات حول الأضواء، نزيف في العين (هيفيما)، صديد في العين (هيببيون)، عدوى بالعين، انزياح +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال، وذمة البقعة، حذقة غير متفاعلة، الجلوكوما الناتجة عن انسداد الحذقة، التهاب حاد بالعين، التهاب القرنية، التهاب العنبيية، فقدان الجسم الزجاجي وزراعة القرنية. قبل التفكير في جراحة +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال يجب أن تجري فحصاً شاملاً للعين وأن تناقش مع طبيب العيون إجراءات +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال، وخاصة الفوائد والمخاطر والمضاعفات المحتملة. يجب عليك مناقشة الوقت اللازم للشفاء بعد الجراحة