

معلومات هامة عن السلامة لزرع +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال

مع استجماتيزم حتى ٦,٠ (D) زرع +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال مصمم لتصحيح أو تقليل قصر النظر حتى -٢,٠ ديوبتر للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ٢١ و ٦٠ سنة. عملية زرع +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال هي إجراء جراحي، وكأي D عملية جراحية أخرى تحمل مخاطر خطيرة محتملة. فيما يلي بعض المضاعفات أو الأحداث السلبية الممكنة: عمليات جراحية إضافية، تكوّن المياه البيضاء (الكاتراكت)، فقدان مؤقت أو دائم لأفضل رؤية ممكنة بعد التصحيح، ارتفاع الضغط داخل العين، فقدان الخلايا على السطح الداخلي للقرنية، تهيج الملتحمة، تورم القرنية، تهيج الملتحمة، التهاب العين الكامل وجود صديد داخل العين، (hyphema) وهج شديد و/أو هالات حول الأضواء، وجود دم داخل العين، (endophthalmitis) عدوى بالعين، تحرك +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال من مكانه، وذمة في الشبكية، عدم استجابة البؤبؤ، مياه، (hypopyon) زرقاء نتيجة انسداد البؤبؤ، التهاب شديد في العين، التهاب القزحية، التهاب العنبية أو العنابية، فقدان الجسم الزجاجي وزرع القرنية. قبل التفكير في عملية زرع +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال يجب إجراء فحص كامل للعين والتحدث مع طبيب العيون الخاص بك عن إجراء +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال، خاصة الفوائد والمخاطر والمضاعفات المحتملة. يجب مناقشة الوقت اللازم للتعافي بعد العملية الجراحية