

معلومات السلامة الهامة لـ +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال
مع إمكانية تصحيح (D) تم تصميم +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال لتصحيح أو تقليل قصر النظر حتى - ٢٠,٠ ديوبتر
الاستجماتيزم حتى ٦,٠ ديوبتر للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ٢١ و ٤٥ سنة. زرع +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال هو
إجراء جراحي، وبالتالي يحمل مخاطر قد تكون خطيرة. وفيما يلي بعض المضاعفات أو الأحداث السلبية المحتملة: عمليات
جراحية إضافية، تكوّن المياه البيضاء، فقدان مؤقت أو دائم لأفضل رؤية مصححة، ارتفاع الضغط داخل العين، فقدان الخلايا في
وهج كبير (endophthalmitis) الطبقة الداخلية للقرنية، تهيج الملتحمة، تورم القرنية، تهيج الملتحمة، التهاب العين الكلي
عدوى في (hypopyon) وجود صديد داخل العين، (hyphema) و/أو ظهور هالات حول الأضواء، وجود دم داخل العين
العين، انزياح +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال، وذمة البقعة الصفراء، عَدَم الاستجابة للحدقة، زرق انسداد الحدقة، التهاب حاد
في العين، التهاب القزحية، التهاب العنبيّة، فقدان الجسم الزجاجي وزراعة القرنية. قبل التفكير في جراحة +ايفو اي سي ال / ايفو
اي سي ال يجب عليك إجراء فحص شامل للعين والتحدث مع أخصائي العناية بالعيون حول إجراء +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي
ال، وخاصة حول الفوائد والمخاطر والمضاعفات المحتملة