

معلومات هامة عن السلامة لـ +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال

مع تصحيح الاستجماتيزم (D) تُستخدم +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال لتصحيح أو تقليل قصر النظر حتى -٢٠,٠ ديوبتر حتى ٦,٠ ديوبتر للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ٢١ و ٦٠ سنة. تعتبر زراعة +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال إجراءً جراحياً وينطوي على مخاطر جسيمة محتملة. تشمل المضاعفات/الآثار الجانبية المحتملة: عمليات جراحية إضافية، تكوّن المياه البيضاء، فقدان مؤقت أو دائم لأفضل رؤية مصححة، ارتفاع ضغط العين، فقدان خلايا الطبقة الداخلية للقرنية، تهيج الملتحمة، تورم القرنية، تهيج الملتحمة، التهاب باطن العين (عدوى كاملة في العين)، وهج وضوح كبير و/أو هالات حول الأضواء، الدم في العين، صديد في العين، عدوى العين، انزياح +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال، وذمة في مركز الشبكية، الحدقة غير المستجيبة، الجلوكوما الناتجة عن انسداد الحدقة، التهاب قوي في العين، التهاب القرنية، التهاب العنبية، فقدان الجسم الزجاجي وزراعة القرنية. قبل التفكير في إجراء عملية +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال يجب عليك عمل فحص كامل للعين والتحدث مع أخصائي العيون حول إجراء +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال، خاصة فيما يتعلق بالفوائد والمخاطر والمضاعفات المحتملة. يجب مناقشة الوقت اللازم للشفاء بعد العملية الجراحية