

معلومات هامة حول السلامة لـ +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال

مع وجود ما يصل إلى ٦,٠ (D) تم تصميم +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال لتصحيح أو تقليل قصر النظر حتى - ٢٠,٠ ديوبتر ديوبتر من الاستجماتيزم للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ٢١ و ٦٠ عامًا. يُعتبر زرع +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال إجراءً جراحياً، وبالتالي فإنه يحمل مخاطر محتملة قد تكون خطيرة. فيما يلي بعض المضاعفات/الآثار الجانبية المحتملة: عمليات جراحية إضافية، تكون الساد، فقدان مؤقت أو دائم لأفضل رؤية مصححة، ارتفاع ضغط العين، فقدان الخلايا على الطبقة الأعمق من القرنية، تهيج الملتحمة، تورم القرنية، تهيج الملتحمة، التهاب باطن المقلة (عدوى كاملة في العين)، وهج شديد و/أو هالات حول الأضواء، دم في العين (هيفيمية)، صديد في العين (هايبوبايون)، عدوى في العين، انزياح +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال، ارتشاح مركز النظر (وذمة بقعية)، تفاعل غير طبيعي للبيوبؤ، الماء الأزرق الناتج عن انسداد البيوبؤ، التهاب شديد في العين، التهاب القرنية، التهاب العنبيّة، فقدان الجسم الزجاجي وزراعة القرنية. قبل التفكير في جراحة +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال يجب أن تخضع لفحص كامل للعين وأن تتحدث مع أخصائي العناية بالعيون حول إجراء +ايفو اي سي ال / ايفو اي سي ال وخاصةً الفوائد والمخاطر والمضاعفات المحتملة